

2025-2026 学年第一学期高一年级第一次诊断考试

数学试题

考试范围：必修一第一二章；考试时间：120 分钟；考试分值：150 分 命题人：田金平

注意事项：

1. 答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2. 请将答案正确填写在答题卡上

一、单项选择题（本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。本大题共 8 小题，共 40 分，答案请写到答题卡）

1. 已知集合 $A = \{a, a^2\}$, $B = \{1, 3\}$, 若 $1 \in A$, 则 $A \cup B$ 中所有元素之和为 ()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

2. 不等式 $\frac{3x-1}{x} \leq 1$ 的解集为 ()

- A. $\left\{x \mid 0 \leq x \leq \frac{1}{2}\right\}$ B. $\left\{x \mid 0 < x \leq \frac{1}{2}\right\}$ C. $\left\{x \mid x \leq \frac{1}{2}\right\}$ D. $\{x \mid x > 0\}$

3. 若要使 $\frac{\sqrt{x^2-2x-8}}{x+2}$ 有意义, 则 x 的取值范围是 ()

- A. $\{x \mid -2 \leq x \leq 4\}$ B. $\{x \mid -2 < x \leq 4\}$
C. $\{x \mid x < -2 \text{ 或 } x \geq 4\}$ D. $\{x \mid x \leq -2 \text{ 或 } x \geq 4\}$

4. 若 $a > b$, $c > d$, 则 ()

- A. $ac^2 > bc^2$ B. $a - c > b - d$
C. $a - d > b - c$ D. $ac > bd$

5. 若 $p: 1-x > 0$ 是 $q: 2x \leq a$ 的必要不充分条件, 则实数 a 的取值范围为 ()

- A. $a > 2$ B. $a \geq 2$ C. $a < 2$ D. $a \leq 2$

6. 已知全集 $U = \{x \in \mathbb{Z} \mid -3.5 < x < 4\}$, 集合 $A = \{-3, -1, 1, 3\}$, 则 $\complement_U A$ 的子集个数为 ()

- A. 1 B. 4 C. 8 D. 16


7. 已知命题 $p: \forall x > 2, x^2 - 1 \geq 0$, 则 $\neg p$ 是 ()

- A. $\exists x \leq 2, x^2 - 1 > 0$ B. $\exists x \leq 2, x^2 - 1 < 0$

C. $\exists x > 2, x^2 - 1 < 0$

D. $\forall x \leq 2, x^2 - 1 \leq 0$

8. 如图，已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的图象顶点在第一象限，且经过 $A(-1, 0)$ 、 $B(0, 1)$ 两个点。则下列说法正确的是：① $abc < 0$ ；② $-1 < a < 0$ ；③ $0 < b < 1$ ；④ $0 < a + b + c < 2$ 。()



A. ①②

B. ①③④

C. ①②④

D. ①②③④

二、多项选择题(本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的，全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。)

9. (多选) 设集合 $P = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $Q = \{x | 2 \leq x \leq 6\}$ ，下列结论中正确的是 ()

A. $P \cap Q = P$

B. $P \cap Q \subseteq P$

C. $P \cup Q = Q$

D. $P \cap Q \subseteq Q$

10. 已知关于 x 不等式 $ax^2 + bx + c > 0$ 的解集为 $(-\infty, -2) \cup (3, +\infty)$ ，则下列选项中正确的是 ()

A. $a < 0$

B. 不等式 $bx + c > 0$ 的解集是 $\{x | x < -6\}$

C. $a + b + c > 0$

D. 不等式 $cx^2 - bx + a < 0$ 的解集为 $(-\infty, -\frac{1}{3}) \cup (\frac{1}{2}, +\infty)$

11. 已知 $a > 0$, $b > 0$, $a + b = 1$ ，则下列结论成立的是 ()

A. $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 的最小值为 4

B. $\frac{1}{a} + \frac{a}{b}$ 的最小值为 3

C. $\frac{1}{1-a} + \frac{1}{2-b}$ 的最小值为 2

D. $a + \frac{1}{b}$ 的最小值为 1

三、填空题(本大题共 3 小题，共 15 分，答案请写到答题卡)

12. 已知集合 $A = \{2a, 2a^2 + a\}$ ，若 $1 \in A$ ，则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

13. 已知 $0 < x - y < 2$, $1 < x + y < 3$, 则 $3x + y$ 的取值范围为_____.

14. 若对任意 $x \in [0, 3]$, $x^2 - ax - a + 3 > 0$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围为_____.

四、解答题 (本大题共 5 小题共 77 分. 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤)


15. 已知全集 U 为 $\mathbb{R}$, 集合 $A = \{x | 0 < x \leq 2\}$, $B = \{x | x < -3 \text{ 或 } x > 1\}$ 求:

(1) $A \cap B$

(2) $(\complement_U A) \cap (\complement_U B)$

(3) $\complement_U (A \cup B)$

16. 如图, 某农户计划用 20 m 的篱笆围成一个一边靠墙 (墙足够长) 的矩形菜地. 设该矩形菜地与墙平行的边长为 x m, 与墙垂直的边长为 y m.



(1) 当 x 为何值时, 面积取得最大值? 最大面积为多少?

(2) 求 $\frac{3x+20}{xy}$ 的最小值.

17. 已知集合 $A = \{x | x \leq -1 \text{ 或 } x \geq 3\}$, $B = \{x | 2a \leq x \leq a+3\}$, 回答下列问题.

(1) 若 $a = 1$, 试求 $(\complement_{\mathbb{R}} A) \cup B$, $A \cap (\complement_{\mathbb{R}} B)$;

(2) 若 $A \cap B = B$, 求实数 a 的取值范围;

18. 已知 $p: -2 \leq x \leq 6$, $q: m \leq x \leq m+1$.

(1) 若 $m = 2$, 那么 p 是 q 的什么条件;

(2) 若 p 是 q 的必要不充分条件, 求实数 m 的取值范围.

19. 若二次函数 $f(x)$ 满足 $f(0) = 1$, $f(x+1) - f(x) = 2x - 1$.

(1) 求 $f(x)$ 的解析式;

(2) 若对于任意实数 x , 不等式 $f(x) \geq ax$ 恒成立, 求实数 a 取值范围.

@高考直通车试题库
海量高清试题免费下载

@高考直通车试题库
海量高清试题免费下载

@高考直通车试题库
海量高清试题免费下载



2025-2026 学年第一学期高一年级第一次诊断考试

数学试题

考试范围：必修一第一二章；考试时间：120 分钟；考试分值：150 分 命题人：田金平

注意事项：

1. 答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2. 请将答案正确填写在答题卡上

一、单项选择题（本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。本大题共 8 小题，共 40 分，答案请写到答题卡）

1. 已知集合 $A = \{a, a^2\}$, $B = \{1, 3\}$, 若 $1 \in A$, 则 $A \cup B$ 中所有元素之和为 ()

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】B

【解析】

【分析】根据 $1 \in A$ 可求参数的值，从而可求 $A \cup B$ 的元素之和。

【详解】因为 $1 \in A$, 故 $a = 1$ 或 $a^2 = 1$,

若 $a = 1$, 则 $a = a^2$, 与元素的互异性矛盾;

若 $a^2 = 1$, 则 $a = 1$ (舍) 或 $a = -1$, 故 $A = \{-1, 1\}$, 故 $A \cup B = \{-1, 1, 3\}$,

所以 $A \cup B$ 中所有元素之和为 3,

故选: B.

2. 不等式 $\frac{3x-1}{x} \leq 1$ 的解集为 ()

A. $\left\{x \mid 0 \leq x \leq \frac{1}{2}\right\}$

B. $\left\{x \mid 0 < x \leq \frac{1}{2}\right\}$

C. $\left\{x \mid x \leq \frac{1}{2}\right\}$

D. $\{x \mid x > 0\}$

【答案】B

【解析】

【分析】根据分式不等式的解法，求解即可。

【详解】不等式可化为 $\frac{3x-1}{x} - 1 \leq 0$, 即 $\frac{2x-1}{x} \leq 0$, 等价于 $\begin{cases} x(2x-1) \leq 0 \\ x \neq 0 \end{cases}$,



解得 $0 < x \leq \frac{1}{2}$ ，则解集为 $\left\{x \mid 0 < x \leq \frac{1}{2}\right\}$.

故选：B.

3. 若要使 $\frac{\sqrt{x^2-2x-8}}{x+2}$ 有意义，则 x 的取值范围是 ()

A. $\{x \mid -2 \leq x \leq 4\}$

B. $\{x \mid -2 < x \leq 4\}$

C. $\{x \mid x < -2 \text{ 或 } x \geq 4\}$

D. $\{x \mid x \leq -2 \text{ 或 } x \geq 4\}$

【答案】C

【解析】

【分析】由题可得 $x^2 - 2x - 8 \geq 0$ 且 $x \neq -2$ ，解不等式即可求解.

【详解】要使 $\frac{\sqrt{x^2-2x-8}}{x+2}$ 有意义，则有 $x^2 - 2x - 8 \geq 0$ 且 $x \neq -2$ ，解得 $x < -2$ 或 $x \geq 4$ ，所以 x 的取值

范围是 $\{x \mid x < -2 \text{ 或 } x \geq 4\}$.

故选 C.

4. 若 $a > b$, $c > d$, 则 ()

A. $ac^2 > bc^2$

B. $a - c > b - d$

C. $a - d > b - c$

D. $ac > bd$

【答案】C

【解析】

【分析】根据不等式的基本性质，或举出反例，逐一检验选项即可.

【详解】选项 A：若 $c^2 = 0$ ，则 $ac^2 = bc^2 = 0$. 所以选项错误.

选项 B：若 $a = 7, b = 6, c = 4, d = 1$ ，满足 $a > b, c > d$ ，但是 $a - c < b - d$. 所以选项 B 错误.

选项 C：因为 $c > d$ ，所以 $-d > -c$ ，又因为 $a > b$ ，所以 $a - d > b - c$. 所以选项 C 正确.

选项 D：若 $a = 7, b = 3, c = -1, d = -2$ ，满足 $a > b, c > d$ ，但是 $ac < bd$ ，所以选项 D 错误.

故选：C.

5. 若 $p: 1 - x > 0$ 是 $q: 2x \leq a$ 的必要不充分条件，则实数 a 的取值范围为 ()

A. $a > 2$

B. $a \geq 2$

C. $a < 2$

D. $a \leq 2$



【答案】C

【解析】

【分析】根据两个命题的关系，得到两集合的包含关系，列不等式求解即可.

【详解】依题意知： $p: x < 1$ ， $q: x \leq \frac{a}{2}$ ，

因为 p 是 q 的必要不充分条件，

所以 $\left\{x \mid x \leq \frac{a}{2}\right\} \subsetneq \{x \mid x < 1\}$ ，所以 $\frac{a}{2} < 1$ ，解得 $a < 2$ 。

故选：C

6. 已知全集 $U = \{x \in \mathbb{Z} \mid -3.5 < x < 4\}$ ，集合 $A = \{-3, -1, 1, 3\}$ ，则 $\delta_U A$ 的子集个数为 ()

A. 1

B. 4

C. 8

D. 16

【答案】C

【解析】

【分析】根据补集的运算和子集的概念求解.

【详解】因为 $U = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ ，则 $\delta_U A = \{-2, 0, 2\}$ ，

所以 $\delta_U A$ 的子集个数为 $2^3 = 8$ 。

故选：C.

7. 已知命题 $p: \forall x > 2, x^2 - 1 \geq 0$ ，则 $\neg p$ 是 ()

A. $\exists x \leq 2, x^2 - 1 > 0$

B. $\exists x \leq 2, x^2 - 1 < 0$

C. $\exists x > 2, x^2 - 1 < 0$

D. $\forall x \leq 2, x^2 - 1 \leq 0$

【答案】C


【解析】

【分析】全称量词命题 $\forall x \in M, p(x)$ 的否定为： $\exists x \in M, \neg p(x)$ 。

【详解】命题 $p: \forall x > 2, x^2 - 1 \geq 0$ 的否定为： $\exists x > 2, x^2 - 1 < 0$ 。

故选：C

8. 如图，已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 的图象顶点在第一象限，且经过 $A(-1, 0)$ 、 $B(0, 1)$ 两个点。则下列说法正确的是：① $abc < 0$ ；② $-1 < a < 0$ ；③ $0 < b < 1$ ；④ $0 < a + b + c < 2$ 。()



A. ①②

B. ①③④

C. ①②④

D. ①②③④

【答案】D

【解析】

【分析】根据图象结合一元二次函数的性质逐项判断即可.

【详解】由图象可知二次函数图象开口向下, 则 $a < 0$,

图象与 y 轴交点为 $B(0, 1)$, 所以 $c = 1 > 0$,

顶点在第一象限, 对称轴 $x = -\frac{b}{2a} > 0$, 又 $a < 0$, 所以 $b > 0$,

所以 $abc < 0$, ①说法正确;

因为图象经过 $A(-1, 0)$ 、 $B(0, 1)$ 两个点, 所以 $\begin{cases} a - b + c = 0 \\ c = 1 \end{cases}$, 解得 $b = a + 1$,

因为 $a < 0$, $b > 0$, 所以 $-1 < a < 0$, ②说法正确;

由 $-1 < a < 0$ 得 $0 < a + 1 < 1$, 即 $0 < b < 1$, ③说法正确;

因为图象顶点在第一象限, 且经过 $A(-1, 0)$,

由二次函数的对称性可知与 x 轴另一个交点的横坐标在 $(1, +\infty)$ 上,

所以当 $x = 1$ 时, $a + b + c > 0$,

又 $-1 < a < 0$, $0 < b < 1$, $c = 1$, 所以 $a + b + c < 2$, 即 $0 < a + b + c < 2$, ④说法正确;

综上①②③④正确;

故选: D

二、多项选择题(本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的四个选项中, 有多个选项是符合题目要求的, 全部选对的得 6 分, 部分选对的得部分分, 有选错的得 0 分.)

9. (多选) 设集合 $P = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $Q = \{x | 2 \leq x \leq 6\}$, 下列结论中正确的是 ()

A. $P \cap Q = P$

B. $P \cap Q \subseteq P$

C. $P \cup Q = Q$

D. $P \cap Q \subseteq Q$

【答案】BD

【解析】

【分析】对于 ABD，先求出 $P \cap Q$ ，再判断，对于 C，求出 $P \cup Q$ ，再判断即可.

【详解】因为集合 $P = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $Q = \{x | 2 \leq x \leq 6\}$ ，所以 $P \cap Q = \{2, 3, 4, 5, 6\}$ ，
因此 $P \cap Q \neq P$ ， $P \cap Q \subseteq Q$, $P \cap Q \subseteq P$ ，所以 A 错误，D 正确，B 正确

又因为 $P \cup Q = Q \cup \{1\}$ ，所以 C 错误.

故选：BD

10. 已知关于 x 的不等式 $ax^2 + bx + c > 0$ 的解集为 $(-\infty, -2) \cup (3, +\infty)$ ，则下列选项中正确的是 ()

A. $a < 0$

B. 不等式 $bx + c > 0$ 的解集是 $\{x | x < -6\}$

C. $a + b + c > 0$

D. 不等式 $cx^2 - bx + a < 0$ 的解集为 $(-\infty, -\frac{1}{3}) \cup (\frac{1}{2}, +\infty)$

【答案】BD

【解析】

【分析】对于 A，根据不等式的解集得到 $a > 0$ 判断 A；对于 B，结合题意得到 -2 和 3 是关于 x 的方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的两根，再结合韦达定理得到 $b = -a, c = -6a$ ，将目标不等式化为 $-ax - 6a > 0$ ，求出解集判断 B，对于 C，结合 $b = -a, c = -6a$ 得到 $a + b + c = -6a < 0$ 判断 C，对于 D，将 $cx^2 - bx + a < 0$ 合理变形后求出解集判断 D 即可.

【详解】对于 A，因为关于 x 的不等式 $ax^2 + bx + c > 0$ 的解集为 $(-\infty, -2) \cup (3, +\infty)$ ，
所以 -2 和 3 是关于 x 的方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的两根，且 $a > 0$ ，故 A 错误；

对于 B，由已知得 -2 和 3 是关于 x 的方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的两根，

$$\text{由韦达定理得} \begin{cases} -2 + 3 = -\frac{b}{a} \\ -2 \times 3 = \frac{c}{a} \end{cases}, \text{解得 } b = -a, c = -6a,$$



对于不等式 $bx + c > 0$ ，即化为 $-ax - 6a > 0$ ，解得 $x < -6$ ，故 B 正确；

对于 C，可得 $a + b + c = -6a < 0$ ，故 C 错误；

对于 D，对于不等式 $cx^2 - bx + a < 0$ ，可化为 $-6ax^2 + ax + a < 0$ ，

而 $a > 0$ ，则化为 $6x^2 - x - 1 > 0$ ，解得 $x \in (-\infty, -\frac{1}{3}) \cup (\frac{1}{2}, +\infty)$ ，故 D 正确。

故选：BD

11. 已知 $a > 0$ ， $b > 0$ ， $a + b = 1$ ，则下列结论成立的是（ ）

A. $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 的最小值为 4

B. $\frac{1}{a} + \frac{a}{b}$ 的最小值为 3

C. $\frac{1}{1-a} + \frac{1}{2-b}$ 的最小值为 2

D. $a + \frac{1}{b}$ 的最小值为 1

【答案】AB

【解析】

【分析】对 A，由“1”的代换结合基本不等式求解；对 B，由 $\frac{1}{a} = 1 + \frac{b}{a}$ 利用基本不等式求解；对 C，由

$(1-a) + (2-b) = 3 - (a+b) = 2$ ，利用基本不等式求解判断；对 D，作差 $a + \frac{1}{b} - 1$ ，判断 $a + \frac{1}{b} > 1$ 得解。

【详解】对于 A， $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = (a+b) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) = 2 + \frac{b}{a} + \frac{a}{b} \geq 2 + 2\sqrt{\frac{b}{a} \cdot \frac{a}{b}} = 4$ ，当且仅当 $a = b = \frac{1}{2}$ 时，取等号，

故 A 正确；

对于 B， $\frac{1}{a} = \frac{a+b}{a} = 1 + \frac{b}{a}$ ，故 $\frac{1}{a} + \frac{a}{b} = 1 + \frac{b}{a} + \frac{a}{b} \geq 1 + 2\sqrt{\frac{b}{a} \cdot \frac{a}{b}} = 3$ ，当且仅当 $a = b = \frac{1}{2}$ 时，取等号，故

B 正确；

对于 C，由 $a > 0, b > 0, a + b = 1$ ，可知 $(1-a) + (2-b) = 3 - (a+b) = 2$ ，且 $1-a > 0, 2-b > 0$ ，

$$\frac{1}{1-a} + \frac{1}{2-b} = \frac{1}{2} [(1-a) + (2-b)] \left(\frac{1}{1-a} + \frac{1}{2-b} \right) = \frac{1}{2} \left(2 + \frac{2-b}{1-a} + \frac{1-a}{2-b} \right) \geq \frac{1}{2} \left(2 + 2\sqrt{\frac{1-a}{2-b} \cdot \frac{2-b}{1-a}} \right) = 2，$$

不等式取等号的条件是 $1-a = 2-b = 1$ ，即 $a = 0, b = 1$ ，与题设 $a > 0, b > 0$ 矛盾，

故 $\frac{1}{1-a} + \frac{1}{2-b}$ 的最小值大于 2，故 C 错误；



对于 D, $a + \frac{1}{b} - 1 = \frac{1}{b} - b = \frac{1-b^2}{b} = \frac{(1+b)(1-b)}{b} > 0$, 故 $a + \frac{1}{b} > 1$, 最小值大于 1, 故 D 错误.

故选: AB.

三、填空题 (本大题共 3 小题, 共 15 分, 答案请写到答题卡)

12. 已知集合 $A = \{2a, 2a^2 + a\}$, 若 $1 \in A$, 则 $a =$ _____.

【答案】 -1

【解析】

【分析】 已知 $A = \{2a, 2a^2 + a\}, 1 \in A$, 则 $2a = 1$ 或 $2a^2 + a = 1$, 结合集合中元素的互异性分情况讨论即可.

【详解】 因为 $A = \{2a, 2a^2 + a\}, 1 \in A$,

所以 $2a = 1$ 或 $2a^2 + a = 1$,

当 $2a = 1$ 时, $a = \frac{1}{2}$, 此时 $2a^2 + a = 1$, 不满足集合中元素的互异性, 舍去;

当 $2a^2 + a = 1$ 时, 解得 $a = -1$ 或 $\frac{1}{2}$ (同上, 舍去),

此时 $A = \{-2, 1\}$.

综上 $a = -1$.

故答案为: -1.

13. 已知 $0 < x - y < 2$, $1 < x + y < 3$, 则 $3x + y$ 的取值范围为_____.

【答案】 (2, 8)

【解析】

【分析】 先设出 $3x + y = a(x - y) + b(x + y)$, 求出 a, b , 再结合不等式的性质解出即可;

【详解】 令 $3x + y = a(x - y) + b(x + y)$, 则 $\begin{cases} a + b = 3, \\ -a + b = 1, \end{cases}$ 解得 $a = 1, b = 2$,

故 $3x + y = (x - y) + 2(x + y)$, 由 $1 < x + y < 3$, 得 $2 < 2(x + y) < 6$,

又 $0 < x - y < 2$, 故 $2 < (x - y) + 2(x + y) < 8$, 即 $2 < 3x + y < 8$.

故答案为: (2, 8)



14. 若对任意 $x \in [0, 3]$, $x^2 - ax - a + 3 > 0$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围为_____.

【答案】 $(-\infty, 2)$

【解析】

【分析】由参变量分离法可得出 $a < \frac{x^2 + 3}{x+1} = x+1 + \frac{4}{x+1} - 2$ 恒成立, 利用基本不等式求出 $x+1 + \frac{4}{x+1} - 2$ 的最小值, 即可得出实数 a 的取值范围.

【详解】当 $0 \leq x \leq 3$ 时, $1 \leq x+1 \leq 4$,

由题意知, 对任意 $x \in [0, 3]$, $x^2 + 3 > a(x+1)$,

即 $a < \frac{x^2 + 3}{x+1} = \frac{x^2 - 1 + 4}{x+1} = x-1 + \frac{4}{x+1} = x+1 + \frac{4}{x+1} - 2$ 恒成立,

由基本不等式可得 $(x+1) + \frac{4}{x+1} - 2 \geq 2\sqrt{(x+1) \cdot \frac{4}{x+1}} - 2 = 2$,

当且仅当 $x+1 = \frac{4}{x+1}$ 时, 即当 $x=1$ 时, 等号成立, 故 $a < \left(x+1 + \frac{4}{x+1} - 2\right)_{\min} = 2$.

即实数 a 的取值范围为 $(-\infty, 2)$.

故答案为: $(-\infty, 2)$.

四、解答题 (本大题共 5 小题共 77 分. 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤)

15. 已知全集 U 为 $\mathbb{R}$, 集合 $A = \{x | 0 < x \leq 2\}$, $B = \{x | x < -3 \text{ 或 } x > 1\}$ 求:

(1) $A \cap B$

(2) $(\complement_U A) \cap (\complement_U B)$

(3) $\complement_U (A \cup B)$

【答案】 (1) $\{x | 1 < x \leq 2\}$

(2) $\{x | -3 \leq x \leq 0\}$

(3) $\{x | -3 \leq x \leq 0\}$

【解析】

【分析】(1) (2) (3) 根据给定条件, 利用集合的交集、补集、并集的定义求解.

【小问 1 详解】



由 $A = \{x | 0 < x \leq 2\}$, $B = \{x | x < -3 \text{ 或 } x > 1\}$, 得 $A \cap B = \{x | 1 < x \leq 2\}$.

【小问 2 详解】


由全集 U 为 $\mathbb{R}$, 得 $\partial_U A = \{x | x \leq 0 \text{ 或 } x > 2\}$, $\partial_U B = \{x | -3 \leq x \leq 1\}$,

所以 $(\partial_U A) \cap (\partial_U B) = \{x | -3 \leq x \leq 0\}$.

【小问 3 详解】

依题意, $A \cup B = \{x | x < -3 \text{ 或 } x > 0\}$, 所以 $\partial_U (A \cup B) = \{x | -3 \leq x \leq 0\}$.

16. 如图, 某农户计划用 20 m 的篱笆围成一个一边靠墙 (墙足够长) 的矩形菜地. 设该矩形菜地与墙平行的边长为 x m, 与墙垂直的边长为 y m.



(1) 当 x 为何值时, 面积取得最大值? 最大面积为多少?

(2) 求 $\frac{3x+20}{xy}$ 的最小值.

【答案】(1) 当 $x=10$ 时, 面积取得最大值, 最大面积为 50m^2

(2) $\frac{9}{10}$

【解析】

【分析】(1) 根据题意可得 $x+2y=20$, 从而可得该菜地的面积为 $S=xy$, 进而利用基本不等式即可求解;

(2) 利用 $x+2y=20$, 根据“1”的代换利用基本不等式可求最小值.

【小问 1 详解】

由题意得 $x+2y=20$, x, y 都为正数,

则该菜地的面积为 $S=xy=\frac{1}{2} \cdot x \cdot 2y \leq \frac{1}{2} \times \left(\frac{x+2y}{2}\right)^2 = 50$,

当且仅当 $x=2y=10$ 时, 等号成立,

所以当 $x=10$ 时, 面积取得最大值, 最大面积为 50m^2 .

【小问 2 详解】

由 $x+2y=20$, x, y 都为正数, 则 $\frac{1}{20}(x+2y)=1$,

$$\begin{aligned}\text{所以 } \frac{3x+20}{xy} &= \frac{3x+(x+2y)}{xy} = \frac{4x+2y}{xy} = \frac{4}{y} + \frac{2}{x} = \frac{1}{20} \left(\frac{4}{y} + \frac{2}{x} \right) (x+2y) \\ &= \frac{1}{20} \left(8+2+\frac{4x}{y} + \frac{4y}{x} \right) \geq \frac{1}{20} \times (10+2\sqrt{16}) = \frac{9}{10},\end{aligned}$$

当且仅当 $\frac{4x}{y} = \frac{4y}{x}$, 又 $2y+x=20$, 即 $x=y=\frac{20}{3}$ 时, 等号成立,

所以 $\frac{3x+20}{xy}$ 的最小值为 $\frac{9}{10}$.

17. 已知集合 $A = \{x | x \leq -1 \text{ 或 } x \geq 3\}$, $B = \{x | 2a \leq x \leq a+3\}$, 回答下列问题.

(1) 若 $a=1$, 试求 $(\complement_{\mathbb{R}} A) \cup B$, $A \cap (\complement_{\mathbb{R}} B)$;

(2) 若 $A \cap B = B$, 求实数 a 的取值范围;

【答案】(1) $\{x | -1 < x \leq 4\}$, $\{x | x \leq -1 \text{ 或 } x > 4\}$

(2) $a \leq -4$ 或 $a \geq \frac{3}{2}$

【解析】

【分析】(1) 求出 $a=1$ 时的集合 B , 再根据补集、交集和并集的定义计算即可;

(2) 由 $A \cap B = B$ 知 $B \subseteq A$, 讨论当 $B = \emptyset$ 和 $B \neq \emptyset$ 时的情形, 分别求出对应的 a 的取值范围.

小问 1 详解】

$A = \{x | x \leq -1 \text{ 或 } x \geq 3\}$, 则 $\complement_{\mathbb{R}} A = \{x | -1 < x < 3\}$,

$B = \{x | 2a \leq x \leq a+3\}$, 当 $a=1$ 时, $B = \{x | 2 \leq x \leq 4\}$,

所以 $(\complement_{\mathbb{R}} A) \cup B = \{x | -1 < x \leq 4\}$;

又 $\complement_{\mathbb{R}} B = \{x | x < 2 \text{ 或 } x > 4\}$, 所以 $A \cap (\complement_{\mathbb{R}} B) = \{x | x \leq -1 \text{ 或 } x > 4\}$.

【小问 2 详解】



若 $A \cap B = B$ ，则 $B \subseteq A$ 。

当 $B = \emptyset$ 时， $2a > a + 3$ ，即 $a > 3$ ；

当 $B \neq \emptyset$ 时，则 $\begin{cases} a \leq 3 \\ a + 3 \leq -1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} a \leq 3 \\ 2a \geq 3 \end{cases}$ ，解得 $a \leq -4$ 或 $\frac{3}{2} \leq a \leq 3$ 。

综上， a 的取值范围为 $a \leq -4$ 或 $a \geq \frac{3}{2}$ 。

18. 已知 $p: -2 \leq x \leq 6$ ， $q: m \leq x \leq m+1$ 。

(1) 若 $m = 2$ ，那么 p 是 q 的什么条件；

(2) 若 p 是 q 的必要不充分条件，求实数 m 的取值范围。

【答案】(1) 必要不充分条件（必要条件也正确）

(2) $[-2, 5]$

【解析】

【分析】(1) 根据集合关系判断 p 是 q 的必要不充分条件；

(2) 根据 p 是 q 的必要不充分条件，得 $\{x | m \leq x \leq m+1\}$ 是 $\{x | -2 \leq x \leq 6\}$ 的真子集，

然后根据集合关系列不等式组求解即可。

【小问 1 详解】

当 $m = 2$ 时， $q: 2 \leq x \leq 3$ ，

显然 $\{x | 2 \leq x \leq 3\}$ 是 $\{x | -2 \leq x \leq 6\}$ 的真子集，

所以 p 是 q 的必要不充分条件（注：必要条件也正确）。

【小问 2 详解】

若 p 是 q 必要不充分条件，

则 $\{x | m \leq x \leq m+1\}$ 是 $\{x | -2 \leq x \leq 6\}$ 的真子集，

则有 $\begin{cases} m \geq -2, \\ m+1 < 6 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} m > -2, \\ m+1 \leq 6, \end{cases}$ 解得 $-2 \leq m \leq 5$ ，

故实数 m 的取值范围为 $[-2, 5]$ 。

19. 若二次函数 $f(x)$ 满足 $f(0) = 1$ ， $f(x+1) - f(x) = 2x - 1$ 。

(1) 求 $f(x)$ 的解析式；



(2) 若对于任意实数 x ，不等式 $f(x) \geq ax$ 恒成立，求实数 a 的取值范围.

【答案】(1) $f(x) = x^2 - 2x + 1$

(2) $[-4, 0]$

【解析】

【分析】(1) 设出 $f(x) = ax^2 + bx + c$ ，结合给定条件建立方程，求解参数，得到函数解析式即可.

(2) 将 $f(x) \geq ax$ 转化 $x^2 - (a+2)x + 1 \geq 0$ ，利用判别式建立不等式，求解参数范围即可.

【小问1详解】

因为 $f(x)$ 是二次函数，所以设 $f(x) = ax^2 + bx + c$ ， $a \neq 0$

因为 $f(0) = 1$ ，所以 $c = 1$ ，此时 $f(x) = ax^2 + bx + 1$ ，

因为 $f(x+1) - f(x) = 2x - 1$ ，所以 $a(x+1)^2 + b(x+1) + 1 - (ax^2 + bx + 1) = 2x - 1$ ，

化简得 $2ax + a + b = 2x - 1$ ，对照系数得 $2a = 2$ ， $a + b = -1$ ，

解得 $a = 1$ ， $b = -2$ ，则 $f(x) = x^2 - 2x + 1$ ，即 $f(x)$ 的解析式为 $f(x) = x^2 - 2x + 1$.

【小问2详解】

由上问知 $f(x) = x^2 - 2x + 1$ ，而对于任意实数 x ，

由 $f(x) \geq ax$ 成立，得到 $x^2 - 2x + 1 \geq ax$ ，即 $x^2 - (a+2)x + 1 \geq 0$ ，

得到 $(a+2)^2 - 4 \leq 0$ ，解得 $-4 \leq a \leq 0$

综上，实数 a 的取值范围是 $[-4, 0]$.

