

礼泉县 2025~2026 学年度第一学期期中学科素养评价质量调研

高一年级数学

注意事项:

1. 本试题共 4 页, 满分 150 分, 时间 120 分钟.
2. 答卷前, 考生务必将自己的姓名和准考证号填写在答题卡上.
3. 回答选择题时, 选出每小题答案后, 用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑. 如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案标号. 涂写在本试卷上无效.
4. 作答非选择题时, 将答案书写在答题卡上, 书写在本试卷上无效.
5. 考试结束后, 监考员将答题卡按顺序收回, 装袋整理; 试题不回收.

一、选择题: 本题共 8 小题, 每小题 5 分, 共 40 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.


1. 已知集合 $A = \{-2, 1, 2\}$, $B = \{x | x \in \mathbf{N}\}$, 则 $A \cap B =$ ()

- A. $\{-2\}$ B. $\{1\}$ C. $\{1, 2\}$ D. $\{-2, 1, 2\}$

2. 下列函数中, 定义域为 $\mathbf{R}$ 的是 ()

- A. $f(x) = \sqrt{x}$ B. $f(x) = \sqrt{x^2} - 2$
C. $f(t) = \frac{1}{t}$ D. $f(t) = \sqrt{-t^2 + 2t}$

3. 下列各图中, 可以表示以 x 为自变量的偶函数的是 ()



4. “ $a - b > 0$ ”是“ $a^2 > b^2$ ”的 ()

A. 必要不充分条件

B. 充分不必要条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

5. 已知 $f(x+2)=2^x-1$, 则 $f(x)$ 的解析式是 ()

A. $f(x)=2^{x-2}-1$

B. $f(x)=4^x-1$

C. $f(x)=(x-2)^2-1$

D. $f(x)=2^x+1$

6. 下列函数中, 与函数 $f(x)=|x-1|$ 为同一函数的是 ()

A. $h(t)=\sqrt{(t-1)^2}$

B. $u(x)=\begin{cases} 1-x, & x \leq 0 \\ x-1, & x > 0 \end{cases}$

C. $v(x)=\frac{x^2-x}{x}$

D. $g(t)=t-1, t \geq 1$

7. 中国清朝数学家李善兰在 1859 年翻译《代数学》中首次将“function”译做“函数”, 沿用至今, 为什么这么翻译, 书中解释说“凡此变数中函彼变数者, 则此为彼之函数”, 这个解释说明了函数的内涵: 只要有一个法则, 使得取值范围中的每一个值 x , 有一个确定的 y 和它对应即可, 而不管这个对应的法则是公式、图象、表格还是其它形式. 函数 $f(x)$ 由下表给出, 则 $f(f(4)-2)$ 的值为 ()

x	$x \leq 0$	$0 < x < 2$	$x \geq 2$
y	1	2	3

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

8. 已知函数 $y=f(x)$ 的图像关于坐标原点成中心对称图形的充要条件是函数 $y=f(x)$ 为奇函数, 将其推广可得: 函数 $y=f(x)$ 的图像关于点 $P(a,b)$ 成中心对称图形的充要条件是函数 $y=f(x+a)-b$ 为奇函数, 下列函数中, 图像关于点 $(1,1)$ 成中心对称图形的是 ()

A. $f(x)=x^3-1$

B. $f(x)=x^3+1$

C. $f(x)=(x+1)^3-1$

D. $f(x)=(x-1)^3+1$

二、多选题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的四个选项中, 有多项符合题目要求, 全部选对的得 6 分, 部分选对的得部分分, 有选错的得 0 分.

9. 下列计算正确的是 ()

A. $8^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{4}$

B. $(-a^2)^3 = a^6$

C. $\sqrt[8]{a^8} = a$

D. $\sqrt[5]{-\pi^5} = -\pi$

10. 下列选项中能证明命题“ $\exists x, y \in \mathbf{R}, x^2 + y^2 - 2x = 1$ ”为真命题的是 ()

A. $x = 0, y = 1$

B. $x = 0, y = -1$

C. $x = -2, y = 1$

D. $x = 2, y = 1$

11. 已知 $a > 0, b > 0$, 则下列命题正确的是 ()

A. 若 $ab = 2$, 则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \sqrt{2}$

B. 函数 $y = a + \frac{1}{a+1}$ 的最小值为 1

C. 若 $a^2 + b^2 = 4$, 则 ab 的最大值为 2

D. 若 $a^2 + ab = 2$, 则 $3a + b$ 的最小值是 4

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

12. 命题“ $\forall x \in \mathbf{Z}, x^2 - 2x < 0$ ”的否定是_____. (用存在量词表示)

13. 已知 $x > 0, y > 0, x + y - 2xy = 0$, 则 xy 的最小值为_____.

14. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x^2} + 5, & x < 0, \\ ax, & x \geq 0, \end{cases}$ 且 $f(a) = 4$, 则 $a =$ _____.

四、解答题: 本题共 5 小题, 共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. 已知集合 $A = \{x | 2 \leq x \leq 5\}, B = \{x | -2 < x \leq 3\}$,

(1) 求 $A \cap B$;

(2) 若全集 $U = A \cup B$, 求 $\complement_U A$.

16. 已知二次函数 $f(x) = ax^2 + (b-2)x + 3$.

(1) 若不等式 $f(x) > 0$ 的解集为 $\{x | -1 < x < 1\}$, 求 a, b 的值;

(2) 若 $f(1) = 2$, 且 $a > 0, b > 0$, 求 $\left(\frac{1}{a} + \frac{4}{b}\right)$ 的最小值, 并写出取最小值时 a, b 的值.



17. 已知幂函数 $y = f(x)$ 的图象过点 $\left(2, \frac{1}{2}\right)$.

- (1) 求 $f(x)$ 的表达式, 并写出其单调区间;
- (2) 若 $0 < f(a+1) \leq f(4-2a)$, 求实数 a 的取值范围.

18. 已知函数 $f(x) = x^2 + ax + 4$.

- (1) 若 $a = -2$, 求函数 $f(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上的值域;
- (2) 若不等式 $f(x) > 2x + 1$ 恒成立, 求 a 的取值范围;
- (3) 已知 $f(x)$ 在区间 $[-2, 2]$ 上单调, 求 $f(x)$ 的最小值 $f(x)_{\min}$.

19. 已知函数 $f(x) = \frac{3^x - a}{3^x + a}$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数.

- (1) 求实数 a 的值;
- (2) 用定义证明函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是增函数;
- (3) 若关于 x 的不等式 $f(mx^2 + 1) + f(3mx) \geq 0$ 对于任意实数 x 恒成立, 求实数 m 的取值范围.

礼泉县 2025~2026 学年度第一学期期中学科素养评价质量调研

高一年级数学

注意事项:

1. 本试题共 4 页, 满分 150 分, 时间 120 分钟.
2. 答卷前, 考生务必将自己的姓名和准考证号填写在答题卡上.
3. 回答选择题时, 选出每小题答案后, 用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑. 如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案标号. 涂写在本试卷上无效.
4. 作答非选择题时, 将答案书写在答题卡上, 书写在本试卷上无效.
5. 考试结束后, 监考员将答题卡按顺序收回, 装袋整理; 试题不回收.

一、选择题: 本题共 8 小题, 每小题 5 分, 共 40 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

1. 已知集合 $A = \{-2, 1, 2\}$, $B = \{x | x \in \mathbf{N}\}$, 则 $A \cap B =$ ()

- A. $\{-2\}$ B. $\{1\}$ C. $\{1, 2\}$ D. $\{-2, 1, 2\}$

【答案】C

【解析】

【分析】利用交集的意义求解即可.

【详解】 $A \cap B = \{-2, 1, 2\} \cap \{x | x \in \mathbf{N}\} = \{1, 2\}$.

故选: C.

2. 下列函数中, 定义域为 $\mathbf{R}$ 的是 ()

- A. $f(x) = \sqrt{x}$ B. $f(x) = \sqrt{x^2 - 2}$
C. $f(t) = \frac{1}{t}$ D. $f(t) = \sqrt{-t^2 + 2t}$

【答案】B

【解析】

【分析】逐项分析各函数的定义域即可.

【详解】A: $f(x) = \sqrt{x}$ 的定义域为 $[0, +\infty)$, 不符合;

B: $f(x) = \sqrt{x^2 - 2}$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 符合;


C: $f(t) = \frac{1}{t}$ 的定义域为 $\{t | t \neq 0\}$, 不符合;



D: 由 $-t^2 + 2t \geq 0$ 解得 $0 \leq t \leq 2$, 所以 $f(t) = \sqrt{-t^2 + 2t}$ 的定义域为 $[0, 2]$, 不符合;

故选: B.

3. 下列各图中, 可以表示以 x 为自变量的偶函数的是 ()



【答案】C

【解析】

【分析】利用函数及偶函数图象的性质判断图象即可.

【详解】A 选项的图象不是函数图象, 故排除,

而偶函数的图像关于 y 轴对称, 所以排除 B, D 选项,

故选: C.

4. “ $a - b > 0$ ” 是 “ $a^2 > b^2$ ” 的 ()

A. 必要不充分条件

B. 充分不必要条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】D

【解析】

【分析】根据给定条件, 利用充分条件、必要条件的定义判断即可.

【详解】不等式 $a - b > 0 \Leftrightarrow a > b$, 取 $a = 2, b = -2$, 满足 $a > b$, 而 $a^2 = 4 = b^2$,

反之, $(-2)^2 > 1^2$, 而 $a = -2 < 1 = b$,

所以 “ $a - b > 0$ ” 是 “ $a^2 > b^2$ ” 的既不充分也不必要条件.

故选: D



5. 已知 $f(x+2)=2^x-1$, 则 $f(x)$ 的解析式是 ()

A. $f(x)=2^{x-2}-1$

B. $f(x)=4^x-1$

C. $f(x)=(x-2)^2-1$

D. $f(x)=2^x+1$

【答案】A

【解析】

【分析】采用换元法求解出 $f(x)$ 的解析式.

【详解】令 $x+2=t$, 则 $x=t-2$, 所以 $f(t)=2^{t-2}-1$,

所以 $f(x)=2^{x-2}-1$,

故选: A.

6. 下列函数中, 与函数 $f(x)=|x-1|$ 为同一函数的是 ()

A. $h(t)=\sqrt{(t-1)^2}$

B. $u(x)=\begin{cases} 1-x, & x \leq 0 \\ x-1, & x > 0 \end{cases}$

C. $v(x)=\frac{x^2-x}{x}$

D. $g(t)=t-1, t \geq 1$

【答案】A

【解析】

【分析】根据给定条件, 利用相同函数的定义逐项判断得解.

【详解】函数 $f(x)=|x-1|$ 定义域为 $\mathbf{R}$, 值域为 $[0, +\infty)$,

对于 A, 函数 $h(t)=\sqrt{(t-1)^2}$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 且 $\sqrt{(t-1)^2}=|t-1|$, 与 $f(x)$ 的对应法则相同, A 是;

对于 B, 函数 $u(x)=\begin{cases} 1-x, & x \leq 0 \\ x-1, & x > 0 \end{cases}$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 值域为 $(-1, +\infty)$, 与 $f(x)$ 的值域不同, B 不是;

对于 C, 函数 $v(x)=\frac{x^2-x}{x}$ 的定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, 与 $f(x)$ 的定义域不同, C 不是;

对于 D, 函数 $g(t)=t-1, t \geq 1$ 的定义域为 $[1, +\infty)$, 与 $f(x)$ 的定义域不同, D 不是.

故选: A

7. 中国清朝数学家李善兰在 1859 年翻译《代数学》中首次将“function”译做“函数”, 沿用至今, 为什么这么翻译, 书中解释说“凡此变数中函彼变数者, 则此为彼之函数”, 这个解释说明了函数的内涵: 只要有一个法



则，使得取值范围中的每一个值 x ，有一个确定的 y 和它对应即可，而不管这个对应的法则是公式、图象、表格还是其它形式. 函数 $f(x)$ 由下表给出，则 $f(f(4)-2)$ 的值为 ()

x	$x \leq 0$	$0 < x < 2$	$x \geq 2$
y	1	2	3

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】B

【解析】

【分析】根据给定条件，利用表格中对应的数据依次判断计算得解.

【详解】依题意， $f(4)=3$ ，所以 $f(f(4)-2)=f(1)=2$.

故选：B

8. 已知函数 $y=f(x)$ 的图像关于坐标原点成中心对称图形的充要条件是函数 $y=f(x)$ 为奇函数，将其推广可得：函数 $y=f(x)$ 的图像关于点 $P(a,b)$ 成中心对称图形的充要条件是函数 $y=f(x+a)-b$ 为奇函数，下列函数中，图像关于点 $(1,1)$ 成中心对称图形的是 ()

A. $f(x)=x^3-1$

B. $f(x)=x^3+1$

C. $f(x)=(x+1)^3-1$

D. $f(x)=(x-1)^3+1$

【答案】D

【解析】

【分析】利用函数关于点对称的充要条件逐项判断即可.

【详解】因为 $f(x)=x^3-1$ ，所以 $f(x)+1=x^3$ ，又 $g(x)=x^3$ 为奇函数，所以 $f(x)=x^3-1$ 关于 $(0,-1)$ 对称，故 A 错误；
因为 $f(x)=x^3+1$ ，所以 $f(x)-1=x^3$ ，又 $g(x)=x^3$ 为奇函数，所以 $f(x)=x^3+1$ 关于 $(0,1)$ 对称，故 B 错误；
因为 $f(x)=(x+1)^3-1$ ，所以 $f(x-1)+1=(x-1+1)^3-1+1=x^3$ ，又 $g(x)=x^3$ 为奇函数，所以 $f(x)=(x+1)^3-1$ 关于 $(-1,-1)$ 对称，故 C 错误；



因为 $f(x) = (x-1)^3 + 1$, 所以 $f(x+1) - 1 = (x+1-1)^3 + 1 - 1 = x^3$,

又 $g(x) = x^3$ 为奇函数, 所以 $f(x) = (x-1)^3 + 1$ 关于 $(1, 1)$ 对称, 故 D 正确.

故选: D.

二、多选题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的四个选项中, 有多项符合题目要求, 全部选对的得 6 分, 部分选对的得部分分, 有选错的得 0 分.

9. 下列计算正确的是 ()

A. $8^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{4}$

B. $(-a^2)^3 = a^6$

C. $\sqrt[8]{a^8} = a$

D. $\sqrt[5]{-\pi^5} = -\pi$

【答案】AD

【解析】

【分析】根据幂指运算, 可得答案.

【详解】对于 A, $8^{-\frac{2}{3}} = \left(\frac{1}{\sqrt[3]{8}}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$, 故 A 正确;

对于 B, $(-a^2)^3 = -a^{2 \times 3} = -a^6$, 故 B 错误;

对于 C, $\sqrt[8]{a^8} = |a|$, 故 C 错误;

对于 D, $\sqrt[5]{-\pi^5} = -\sqrt[5]{\pi^5} = -\pi$, 故 D 正确.

故选: AD.

10. 下列选项中能证明命题“ $\exists x, y \in \mathbf{R}, x^2 + y^2 - 2x = 1$ ”为真命题的是 ()

A. $x = 0, y = 1$

B. $x = 0, y = -1$

C. $x = -2, y = 1$

D. $x = 2, y = 1$

【答案】ABD

【解析】

【分析】代入检验可得结果.

【详解】A: 当 $x = 0, y = 1$ 时, $x^2 + y^2 - 2x = 1$, 为真命题;

B: 当 $x = 0, y = -1$ 时, $x^2 + y^2 - 2x = 1$, 为真命题;

C: 当 $x = -2, y = 1$ 时, $x^2 + y^2 - 2x = 9 \neq 1$, 为假命题;



D: 当 $x=2, y=1$ 时, $x^2+y^2-2x=1$, 为真命题;

故选: ABD.

11. 已知 $a>0, b>0$, 则下列命题正确的是 ()

A. 若 $ab=2$, 则 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\geq\sqrt{2}$

B. 函数 $y=a+\frac{1}{a+1}$ 的最小值为 1

C. 若 $a^2+b^2=4$, 则 ab 的最大值为 2

D. 若 $a^2+ab=2$, 则 $3a+b$ 的最小值是 4

【答案】ACD

【解析】

【分析】利用基本不等式逐项计算可判断每个选项的正确性.

【详解】对于 A, $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\geq 2\sqrt{\frac{1}{a}\times\frac{1}{b}}=2\sqrt{\frac{1}{ab}}=2\sqrt{\frac{1}{2}}=\sqrt{2}$,

当且仅当 $\frac{1}{a}=\frac{1}{b}$, 即 $a=b=\sqrt{2}$ 时取等号, 故 A 正确;

对于 B, $y=a+\frac{1}{a+1}=a+1+\frac{1}{a+1}-1\geq 2\sqrt{(a+1)\times\frac{1}{a+1}}-1=1$,

当且仅当 $a+1=\frac{1}{a+1}$, 即 $a=0$ 时取等号, 又 $a>0$, 所以等号取不到,

所以函数 $y=a+\frac{1}{a+1}$ 的最小值不为 1, 故 B 错误;

对于 C, $ab\leq\frac{a^2+b^2}{2}=\frac{4}{2}=2$, 当且仅当 $a=b=\sqrt{2}$ 时取等号,

所以 ab 的最大值为 2, 故 C 正确;

对于 D, 由 $a^2+ab=2$, 得 $a(a+b)=2$,

所以 $3a+b=2a+(a+b)\geq 2\sqrt{2a(a+b)}=2\sqrt{2\times 2}=4$,

当且仅当 $2a=a+b$, 即 $a=b=1$ 时取等号, 所以 $3a+b$ 的最小值是 4, 故 D 正确.

故选: ACD.

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

12. 命题 “ $\forall x\in\mathbf{Z}, x^2-2x<0$ ” 的否定是_____. (用存在量词表示)

【答案】 $\exists x \in \mathbf{Z}, x^2 - 2x \geq 0$

【解析】

【分析】 利用全称量词命题的否定为存在量词命题写出结论.

【详解】 命题 “ $\forall x \in \mathbf{Z}, x^2 - 2x < 0$ ” 是全称量词命题, 其否定是存在量词命题,

所以所求否定是: $\exists x \in \mathbf{Z}, x^2 - 2x \geq 0$.

故答案为: $\exists x \in \mathbf{Z}, x^2 - 2x \geq 0$

13. 已知 $x > 0, y > 0, x + y - 2xy = 0$, 则 xy 的最小值为_____.

【答案】 1

【解析】

【分析】 利用基本不等式可得 $2\sqrt{xy} - 2xy \leq 0$, 结合已知求解可得 xy 的最小值.

【详解】 因为 $x > 0, y > 0, x + y \geq 2\sqrt{xy}$, 所以 $2\sqrt{xy} - 2xy \leq 0$, 所以 $\sqrt{xy} - (\sqrt{xy})^2 \leq 0$,

所以 $(\sqrt{xy})^2 - \sqrt{xy} \geq 0$, 解得 $\sqrt{xy} \geq 1$ 或 $\sqrt{xy} \leq 0$ (舍去), 所以 $xy \geq 1$,

当且仅当 $x = y = 1$ 时取等号, 故 xy 的最小值为 1.

故答案为: 1.

14. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x^2} + 5, & x < 0, \\ ax, & x \geq 0, \end{cases}$ 且 $f(a) = 4$, 则 $a =$ _____.

【答案】 2 或 -1

【解析】

【分析】 已知函数 $f(x)$ 为分段函数, 根据函数性质结合 $f(a) = 4$, 分 $a \geq 0$ 和 $a < 0$ 两种情况讨论得出对应的 a 值, 并验证是否符合题意.

【详解】 当 $a \geq 0$ 时, $f(a) = a^2 = 4$, 解得 $a = \pm 2$,

因为 $a \geq 0$, 故 $a = 2$.

当 $a < 0$ 时, $f(a) = -\frac{1}{a^2} + 5 = 4$, 解得 $a = \pm 1$,

因为 $a < 0$, 故 $a = -1$.

验证: 当 $a = 2$ 时, $f(2) = 2^2 = 4$, 符合题意;

当 $a = -1$ 时, $f(-1) = -\frac{1}{(-1)^2} + 5 = 4$, 符合题意.

故答案为: 2 或 -1.

四、解答题: 本题共 5 小题, 共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. 已知集合 $A = \{x | 2 \leq x \leq 5\}$, $B = \{x | -2 < x \leq 3\}$,

(1) 求 $A \cap B$;

(2) 若全集 $U = A \cup B$, 求 $\complement_U A$.

【答案】(1) $A \cap B = \{x | 2 \leq x \leq 3\}$

(2) $\complement_U A = \{x | -2 < x < 2\}$

【解析】

【分析】(1) 利用交集的定义运算即可.

(2) 根据补集及并集的定义运算即可.

【小问 1 详解】

因为 $A = \{x | 2 \leq x \leq 5\}$, $B = \{x | -2 < x \leq 3\}$, 所以 $A \cap B = \{x | 2 \leq x \leq 3\}$.

【小问 2 详解】

因为 $U = A \cup B$, 所以 $U = A \cup B = \{x | -2 < x \leq 5\}$,

所以 $\complement_U A = \{x | -2 < x < 2\}$.

16. 已知二次函数 $f(x) = ax^2 + (b-2)x + 3$.

(1) 若不等式 $f(x) > 0$ 的解集为 $\{x | -1 < x < 1\}$, 求 a, b 的值;

(2) 若 $f(1) = 2$, 且 $a > 0, b > 0$, 求 $\left(\frac{1}{a} + \frac{4}{b}\right)$ 的最小值, 并写出取最小值时 a, b 的值.

【答案】(1) $a = -3, b = 2$

(2) 最小值为 9, $a = \frac{1}{3}, b = \frac{2}{3}$

【解析】

【分析】(1) 根据一元二次不等式解集与方程根的关系, 结合韦达定理求解出 a, b 的值;

(2) 根据条件确定出 a, b 的关系, 再通过“1”的代换求解出最小值, 并根据取等号的条件求解出此时 a, b 的

值.

【小问 1 详解】

因为 $ax^2 + (b-2)x + 3 > 0$ 的解集为 $\{x | -1 < x < 1\}$,

$$\text{由条件可知} \begin{cases} a \neq 0 \\ -\frac{b-2}{a} = -1+1, \text{ 解得 } a = -3, b = 2; \\ \frac{3}{a} = -1 \times 1 \end{cases}$$

【小问 2 详解】

因为 $f(1) = 2$, 所以 $a + b - 2 + 3 = 2$, 所以 $a + b = 1$,

因为 $a > 0, b > 0$, 所以 $\frac{1}{a} + \frac{4}{b} = (a+b) \left(\frac{1}{a} + \frac{4}{b} \right) = 5 + \frac{4a}{b} + \frac{b}{a} \geq 5 + 2\sqrt{\frac{4a}{b} \cdot \frac{b}{a}} = 9$,

当且仅当 $b = 2a$, 即 $a = \frac{1}{3}, b = \frac{2}{3}$ 时取等号,

所以 $\frac{1}{a} + \frac{4}{b}$ 的最小值为 9, 此时 $a = \frac{1}{3}, b = \frac{2}{3}$.

17. 已知幂函数 $y = f(x)$ 的图象过点 $\left(2, \frac{1}{2}\right)$.

(1) 求 $f(x)$ 的表达式, 并写出其单调区间;

(2) 若 $0 < f(a+1) \leq f(4-2a)$, 求实数 a 的取值范围.

【答案】(1) $f(x) = \frac{1}{x}$, 单调递减区间为 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$, 无单调递增区间

(2) $[1, 2)$

【解析】

【分析】(1) 设出幂函数解析式, 代入坐标可求解析式, 再写出单调区间即可;

(2) 先判断出自变量范围, 再结合单调性列出不等式组, 由此可求结果.

【小问 1 详解】

设 $f(x) = x^a$, 代入 $\left(2, \frac{1}{2}\right)$, 则 $2^a = \frac{1}{2}$, 解得 $a = -1$,

所以 $f(x) = \frac{1}{x}$, 单调递减区间为 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$, 无单调递增区间;

【小问 2 详解】



由 $f(x) > 0$ 可知 $x > 0$ ，又因为 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减，

$$\text{所以 } 0 < f(a+1) \leq f(4-2a) \Leftrightarrow \begin{cases} a+1 > 0 \\ 4-2a > 0 \\ a+1 \geq 4-2a \end{cases}, \text{ 解得 } 1 \leq a < 2,$$

所以实数 a 的取值范围是 $[1, 2)$.

18. 已知函数 $f(x) = x^2 + ax + 4$.

(1) 若 $a = -2$ ，求函数 $f(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上的值域；

(2) 若不等式 $f(x) > 2x + 1$ 恒成立，求 a 的取值范围；

(3) 已知 $f(x)$ 在区间 $[-2, 2]$ 上单调，求 $f(x)$ 的最小值 $f(x)_{\min}$.

【答案】(1) $[3, 12]$

(2) $(2 - 2\sqrt{3}, 2 + 2\sqrt{3})$

(3) $f(x)_{\min} = \begin{cases} 8 - 2a, & a \geq 4 \\ 8 + 2a, & a \leq -4 \end{cases}$

【解析】

【分析】(1) 根据对称轴确定出单调性，则最值可求，值域可确定；

(2) 将问题转化为“ $x^2 + (a-2)x + 3 > 0$ 恒成立”，利用 $\Delta < 0$ 求解出结果；

(3) 根据对称轴与区间端点的关系分类讨论，利用单调性求解出最小值，由此可得 $f(x)_{\min}$ 的表示.

【小问 1 详解】

当 $a = -2$ 时， $f(x) = x^2 - 2x + 4$ ，对称轴 $x = 1$ ，

所以 $f(x)$ 在 $[-2, 1]$ 上单调递减，在 $(1, 2]$ 上单调递增，所以 $f(x)_{\min} = f(1) = 3$ ，

又因为 $f(-2) = 12$ ， $f(2) = 4$ ，所以 $f(x)_{\max} = 12$ ，

所以 $f(x)$ 的值域为 $[3, 12]$ ；

【小问 2 详解】

因为 $f(x) > 2x + 1$ 恒成立，所以 $x^2 + (a-2)x + 3 > 0$ 恒成立，

所以 $\Delta = (a-2)^2 - 12 < 0$ ，解得 $2 - 2\sqrt{3} < a < 2 + 2\sqrt{3}$ ，



所以 a 的取值范围为 $(2-2\sqrt{3}, 2+2\sqrt{3})$;

【小问 3 详解】

$f(x) = x^2 + ax + 4$ 的对称轴 $x = -\frac{a}{2}$,

因为 $f(x)$ 在区间 $[-2, 2]$ 上单调, 所以 $-\frac{a}{2} \leq -2$ 或 $-\frac{a}{2} \geq 2$,

当 $-\frac{a}{2} \leq -2$, 即 $a \geq 4$ 时, $f(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上单调递增, 所以 $f(x)_{\min} = f(-2) = 8 - 2a$,

当 $-\frac{a}{2} \geq 2$, 即 $a \leq -4$ 时, $f(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上单调递减, 所以 $f(x)_{\min} = f(2) = 8 + 2a$,

所以 $f(x)_{\min} = \begin{cases} 8 - 2a, & a \geq 4 \\ 8 + 2a, & a \leq -4 \end{cases}$.

19. 已知函数 $f(x) = \frac{3^x - a}{3^x + a}$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数.

(1) 求实数 a 的值;

(2) 用定义证明函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是增函数;

(3) 若关于 x 的不等式 $f(mx^2 + 1) + f(3mx) \geq 0$ 对于任意实数 x 恒成立, 求实数 m 的取值范围.

【答案】(1) $a = 1$;

(2) 证明见解析; (3) $0 \leq m \leq \frac{4}{9}$.

【解析】

【分析】(1) 利用奇函数性质求出 a , 再利用定义验证即得.

(2) 利用增函数的定义, 结合指数函数单调性及不等式性质推理得证.

(3) 利用奇函数及增函数的性质等价变形不等式, 再利用一元二次不等式恒成立求解.

【小问 1 详解】

由函数 $f(x) = \frac{3^x - a}{3^x + a}$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 得 $f(0) = \frac{1 - a}{1 + a} = 0$, 解得 $a = 1$,

此时 $f(x) = \frac{3^x - 1}{3^x + 1}$, $f(-x) = \frac{3^{-x} - 1}{3^{-x} + 1} = \frac{1 - 3^x}{1 + 3^x} = -f(x)$, 函数 $f(x)$ 是奇函数,

所以 $a = 1$.

【小问 2 详解】

由 (1) 知, $f(x) = \frac{3^x + 1 - 2}{3^x + 1} = 1 - \frac{2}{3^x + 1}$,



任意 $x_1, x_2 \in \mathbf{R}, x_1 < x_2$, 由函数 $y = 3^x$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 得 $0 < 3^{x_1} < 3^{x_2}$,

则 $1 < 3^{x_1} + 1 < 3^{x_2} + 1$, $\frac{2}{3^{x_1} + 1} > \frac{2}{3^{x_2} + 1}$, 于是 $1 - \frac{2}{3^{x_1} + 1} < 1 - \frac{2}{3^{x_2} + 1}$, 即 $f(x_1) < f(x_2)$,

所以函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是增函数.

【小问 3 详解】

对任意实数 x , 不等式 $f(mx^2 + 1) + f(3mx) \geq 0 \Leftrightarrow f(mx^2 + 1) \geq -f(3mx) = f(-3mx)$ 恒成立,

即对任意实数 x , $mx^2 + 1 \geq -3mx \Leftrightarrow mx^2 + 3mx + 1 \geq 0$ 恒成立,

当 $m = 0$ 时, $1 \geq 0$ 恒成立, 则 $m = 0$;

当 $m \neq 0$ 时, $\begin{cases} m > 0 \\ \Delta = 9m^2 - 4m \leq 0 \end{cases}$, 解得 $0 < m \leq \frac{4}{9}$,

所以实数 m 的取值范围是 $0 \leq m \leq \frac{4}{9}$.

